

Anhang I: Vorkommende Böden im Gemeindegebiet Wiesenburg/Mark

Subtypen	Substrate	LE-Nr. BÜK
Podsol		
<i>überwiegend Podsole und Braunerde-Podsole, verbreitet Podsol-Braunerden, gering verbreitet vergleyte Podsole und selten Podsol-Regosole</i>	<i>Flugsand</i>	2
<i>Verbreitet Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsole aus Flugsand; verbreitet podsolige, vergleyte Braunerden und podsolige Gley-Braunerden aus Sand über Urstromtalsand; gering verbreitet podsolige Regosole und Podsole aus Flugsand über tiefem Flusssand</i>	<i>Flugsand, Sand über Urstromtalsand</i>	4
Podsol – Braunerden		
<i>überwiegend podsolige Braunerden und gering verbreitet Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsole aus Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet podsolige Regosole, Podsol-Regosole und Podsole aus Flugsand über tiefem Schmelzwassersand</i>	<i>Sand über Schmelzwassersand</i>	38
<i>überwiegend podsolige, lessivierte Braunerden und Podsol-Braunerden sowie gering verbreitet podsolige, lessivierte Braunerden aus Lehmsand, z.T. Lösssand über Schmelzwassersand; gering verbreitet Braunerden, z.T. lessiviert oder podsolig aus Sand über Lehmsand oder aus Lehmsand; selten vergleyte Braunerden aus Lehmsand über Schmelzwassersand</i>	<i>Lösssand über Schmelzwassersand</i>	39
<i>podsolige Braunerden und Podsol-Braunerden überwiegend aus Sand über Schmelzwassersand und gering verbreitet aus kiesführendem Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet Podsole und Braunerde-Podsole aus Sand über Schmelzwassersand; selten lessivierte Braunerden aus Sand über Lehmsand oder Lehm sowie vergleyte Braunerden aus Sand über Urstromtal- oder Schmelzwassersand</i>	<i>Sand über Schmelzwassersand</i>	43
<i>überwiegend podsolige Braunerden und Podsol-Braunerden aus Lehmsand über Schmelzwassersand; verbreitet podsolige Braunerden und lessivierte Podsol-Braunerden aus Lehmsand über Lehm, z.T. Moränenlehm; gering verbreitet Pseudogley-Podsole und pseudovergleyte Fahlerde-Braunerden und selten pseudovergleyte Braunerden aus Lehmsand über Lehm oder Beckenschluff</i>	<i>Lehmsand über Schmelzwassersand</i>	62
Braunerde		
<i>vorherrschend Braunerden, z.T. lessiviert und gering verbreitet Braunerden, meist vergleyt, z.T. podsolig aus Lehmsand über Schmelzwassersand; gering verbreitet Braunerden, meist podsolig, z.T. lessiviert aus Sand über Schmelzwassersand</i>	<i>Lehmsand über Schmelzwassersand</i>	40
<i>überwiegend Braunerden, z.T. lessiviert und gering verbreitet vergleyte Braunerden und Gley-Braunerden aus Sand über deluvialen Sand oder Lehmsand; gering verbreitet Braunerden, z.T. lessiviert und Fahlerde-Braunerden aus Lehmsand über</i>	<i>Sand über Lehmsand</i>	49

Subtypen	Substrate	LE-Nr. BÜK
<i>deluvialen Sand oder Lehmsand; selten lessivierte Braunerden und Fahlerde-Braunerden aus Lehmsand über Lehm</i>		
<i>überwiegend Braunerden, z.T. lessiviert aus Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet lessivierte Braunerden und Fahlerde-Braunerden aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm</i>	<i>Sand über Schmelzwassersand</i>	53
<i>überwiegend Braunerden, meist lessiviert und gering verbreitet Fahlerde-Braunerden aus Lehmsand über Schmelzwassersand; gering verbreitet lessivierte Braunerden und Fahlerde-Braunerden und gering verbreitet Braunerden-Fahlerden und Fahlerden aus Sand über Lehmsand; selten pseudovergleyte Braunerden aus Sand über Lehmsand</i>	<i>Lehmsand über Schmelzwassersand</i>	55
<i>vorherrschend Braunerden, z.T. podsolig und Podsol-Braunerden aus Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet podsolige, lessivierte Braunerden und podsolige Fahlerde-Braunerden aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm; selten vergleyte Braunerden und Gley-Braunerden aus Sand über Schmelzwassersand</i>	<i>Sand über Schmelzwassersand</i>	56
Gley-Braunerde		
<i>überwiegend Braunerde-Gleye, verbreitet pseudovergleyte Braunerde-Gleye, Gley-Braunerden und vergleyte Braunerden sowie gering verbreitet Pseudogley-Gleye und vergleyte Pseudogley-Braunerden aus Lehmsand über Beckenton; selten Reliktmoorgleye aus flachem Torf über Flusssand</i>	<i>Lehmsand über Beckenton</i>	30
Braunerde – Fahlerde		
<i>überwiegend aus Sandlöss über Schmelzwassersand und gering verbreitet aus Sandlöss über Lehmsand; gering verbreitet Braunerden, meist lessiviert aus Sand über Schmelzwassersand</i>	<i>Sand über Schmelzwassersand</i>	8
<i>überwiegend aus Sandlöss über Lehm oder Lehmsand und gering verbreitet aus Sandlöss über Schmelzwassersand; gering verbreitet pseudovergleyte Fahlerde-Braunerden und Pseudogley-Fahlerden aus Sandlöss über Lehm</i>	<i>Sandlöss über Lehm</i>	9
<i>überwiegend Braunerde-Fahlerden und Fahlerden und gering verbreitet pseudovergleyte Braunerde-Fahlerden aus Lehmsand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm; gering verbreitet Braunerden, meist lessiviert aus Lehmsand oder Sand über Schmelzwassersand; selten Kolluvisole aus Kolluviallehmsand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm</i>	<i>Sand über Schmelzwassersand</i>	61
Gley		
<i>vorherrschend Humusgleye und gering verbreitet Anmoorgleye aus Flusssand; selten Erdniedermoore aus Torf über Flusssand</i>	<i>Flusssand</i>	26
Pseudogley		
<i>überwiegend Pseudogley-Fahlerden und Fahlerde-Pseudogleye aus Sand oder Lehmsand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm; verbreitet Pseudogleye aus</i>	<i>Sand oder Lehmsand über Lehm, Lehmsand über Lehm</i>	68

Subtypen	Substrate	LE-Nr. BÜK
<i>Lehmsand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm; gering verbreitet Braunerden, meist lessiviert aus Sand oder Lehmsand über Schmelzwassersand; selten Gley-Pseudogleye und Psedogley-Gleye aus Sand über Lehm, z.T. über Moränencarbonatlehm</i>		